

GEORGIAN MEDICAL NEWS

ISSN 1512-0112

No 10 (307) Октябрь 2020

ТБИЛИСИ - NEW YORK



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Медицинские новости Грузии
საქართველოს სამედიცინო სიახლეбо

GEORGIAN MEDICAL NEWS

No 10 (307) 2020

Published in cooperation with and under the patronage
of the Tbilisi State Medical University

Издается в сотрудничестве и под патронажем
Тбилисского государственного медицинского университета

გამოიცემა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
თანამშრომლობითა და მისი პატრონაჟით

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ТБИЛИСИ - НЬЮ-ЙОРК**

GMN: Georgian Medical News is peer-reviewed, published monthly journal committed to promoting the science and art of medicine and the betterment of public health, published by the GMN Editorial Board and The International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (U.S.A.) since 1994. **GMN** carries original scientific articles on medicine, biology and pharmacy, which are of experimental, theoretical and practical character; publishes original research, reviews, commentaries, editorials, essays, medical news, and correspondence in English and Russian.

GMN is indexed in MEDLINE, SCOPUS, PubMed and VINITI Russian Academy of Sciences. The full text content is available through EBSCO databases.

GMN: Медицинские новости Грузии - ежемесячный рецензируемый научный журнал, издаётся Редакционной коллегией и Международной академией наук, образования, искусств и естествознания (IASEIA) США с 1994 года на русском и английском языках в целях поддержки медицинской науки и улучшения здравоохранения. В журнале публикуются оригинальные научные статьи в области медицины, биологии и фармации, статьи обзорного характера, научные сообщения, новости медицины и здравоохранения.

Журнал индексируется в MEDLINE, отражён в базе данных SCOPUS, PubMed и ВИНИТИ РАН. Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO.

GMN: Georgian Medical News – საქართველოს სამედიცინო ხიახლები – არის ყოველთვიური სამეცნიერო სამედიცინო რევიუზირებადი ჟურნალი, გამოიცემა 1994 წლიდან, წარმოადგენს სარედაქციო კოლეგიისა და აშშ-ის მეცნიერების, განათლების, ინდუსტრიის, ხელოვნებისა და ბუნებისმეტყველების საერთაშორისო აკადემიის ერთობლივ გამოცემას. GMN-ში რუსულ და ინგლისურ ენებზე ქვეყნება ექსპერიმენტული, თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის ორიგინალური სამეცნიერო სტატიები მედიცინის, ბიოლოგიისა და ფარმაციის სფეროში, მიმოხილვითი ხასიათის სტატიები.

ჟურნალი ინდექსირებულია MEDLINE-ის საერთაშორისო სისტემაში, ასახულია SCOPUS-ის, PubMed-ის და ВИНИТИ РАН-ის მონაცემთა ბაზებში. სტატიების სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია EBSCO-ს მონაცემთა ბაზებიდან.

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ

Ежемесячный совместный грузино-американский научный электронно-печатный журнал
Агентства медицинской информации Ассоциации деловой прессы Грузии,
Академии медицинских наук Грузии, Международной академии наук, индустрии,
образования и искусств США.
Издается с 1994 г., распространяется в СНГ, ЕС и США

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Николай Пирцхалаяшвили

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

Елена Гиоргадзе

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Нино Микаберидзе

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Зураб Вадачкория - председатель Научно-редакционного совета

Михаил Бахмутский (США), Александр Геннинг (Германия), Амиран Гамкрелидзе (Грузия),
Константин Кипиани (Грузия), Георгий Камкамидзе (Грузия),
Паата Куртанидзе (Грузия), Вахтанг Масхулия (Грузия),
Тенгиз Ризнис (США), Реваз Сепиашвили (Грузия), Дэвид Элуа (США)

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Константин Кипиани - председатель Научно-редакционной коллегии

Архимандрит Адам - Вахтанг Ахаладзе, Амиран Антадзе, Нелли Антелава, Тенгиз Асатиани,
Гия Берадзе, Рима Бериашвили, Лео Бокерия, Отар Герзмава, Лиана Гогиашвили, Нодар Гогебашвили,
Николай Гонгадзе, Лия Дваладзе, Манана Жвания, Тамар Зерекидзе, Ирина Квачадзе,
Нана Квирквелия, Зураб Кеванишвили, Гурам Кикнадзе, Дмитрий Кордзаиа, Теймураз Лежава,
Нодар Ломидзе, Джанлуиджи Мелотти, Марина Мамаладзе, Карапан Пагава,
Мамука Пирцхалаяшвили, Анна Рехвиашвили, Мака Сологашвили, Рамаз Хепуриани,
Рудольф Хохенфельнер, Каабер Челидзе, Тинатин Чиковани, Арчил Чхотуа,
Рамаз Шенгелия, Кетеван Эбралидзе

Website:

www.geomednews.org

The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts. P.O.Box 390177,
Mountain View, CA, 94039-0177, USA. Tel/Fax: (650) 967-4733

Версия: печатная. Цена: свободная.

Условия подписки: подписка принимается на 6 и 12 месяцев.

По вопросам подписки обращаться по тел.: 293 66 78.

Контактный адрес: Грузия, 0177, Тбилиси, ул. Асатиани 7, IV этаж, комната 408
тел.: 995(32) 254 24 91, 5(55) 75 65 99

Fax: +995(32) 253 70 58, e-mail: ninomikaber@geomednews.com; nikopir@geomednews.com

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 5(99) 97 95 93

© 2001. Ассоциация деловой прессы Грузии

**© 2001. The International Academy of Sciences,
Education, Industry & Arts (USA)**

GEORGIAN MEDICAL NEWS

Monthly Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper formats of the Agency of Medical Information of the Georgian Association of Business Press; Georgian Academy of Medical Sciences; International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (USA).

Published since 1994. Distributed in NIS, EU and USA.

EDITOR IN CHIEF

Nicholas Pirtskhalaishvili

SCIENTIFIC EDITOR

Elene Giorgadze

DEPUTY CHIEF EDITOR

Nino Mikaberidze

SCIENTIFIC EDITORIAL COUNCIL

Zurab Vadachkoria - Head of Editorial council

Michael Bakhtmutsky (USA), Alexander Gënning (Germany),

Amiran Gamkrelidze (Georgia), David Elua (USA),

Konstantin Kipiani (Georgia), Giorgi Kamkamidze (Georgia), Paata Kurtanidze (Georgia),

Vakhtang Maskhulia (Georgia), Tengiz Riznis (USA), Revaz Sepiashvili (Georgia)

SCIENTIFIC EDITORIAL BOARD

Konstantin Kipiani - Head of Editorial board

Archimandrite Adam - Vakhtang Akhaladze, Amiran Antadze, Nelly Antelava,

Tengiz Asatiani, Gia Beradze, Rima Beriashvili, Leo Bokeria, Kakhaber Chelidze,

Tinatin Chikovani, Archil Chkhhotua, Lia Dvaladze, Ketevan Ebralidze, Otar Gerzmava,

Liana Gogiashvili, Nodar Gogebashvili, Nicholas Gongadze, Rudolf Hohenfellner,

Zurab Kevanishvili, Ramaz Khetsuriani, Guram Kiknadze, Dimitri Kordzaia, Irina Kvachadze,

Nana Kvirkvelia, Teymuraz Lezhava, Nodar Lomidze, Marina Mamaladze, Gianluigi Melotti,

Kharaman Pagava, Mamuka Pirtskhalaishvili, Anna Rekhviashvili, Maka Sologhashvili,

Ramaz Shengelia, Tamar Zerekidze, Manana Zhvania

CONTACT ADDRESS IN TBILISI

GMN Editorial Board

7 Asatiani Street, 4th Floor

Tbilisi, Georgia 0177

Phone: 995 (32) 254-24-91

995 (32) 253-70-58

Fax: 995 (32) 253-70-58

CONTACT ADDRESS IN NEW YORK

NINITEX INTERNATIONAL, INC.

3 PINE DRIVE SOUTH

ROSLYN, NY 11576 U.S.A.

WEBSITE

www.geomednews.org

Phone: +1 (917) 327-7732

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:

1. Статья должна быть представлена в двух экземплярах, на русском или английском языках, напечатанная через **полтора интервала на одной стороне стандартного листа с шириной левого поля в три сантиметра**. Используемый компьютерный шрифт для текста на русском и английском языках - **Times New Roman (Кириллица)**, для текста на грузинском языке следует использовать **AcadNusx**. Размер шрифта - **12**. К рукописи, напечатанной на компьютере, должен быть приложен CD со статьей.

2. Размер статьи должен быть не менее десяти и не более двадцати страниц машинописи, включая указатель литературы и резюме на английском, русском и грузинском языках.

3. В статье должны быть освещены актуальность данного материала, методы и результаты исследования и их обсуждение.

При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать вид и количество экспериментальных животных, применяющиеся методы обезболивания и усыпления (в ходе острых опытов).

4. К статье должны быть приложены краткое (на полстраницы) резюме на английском, русском и грузинском языках (включающее следующие разделы: цель исследования, материал и методы, результаты и заключение) и список ключевых слов (key words).

5. Таблицы необходимо представлять в печатной форме. Фотокопии не принимаются. **Все цифровые, итоговые и процентные данные в таблицах должны соответствовать таковым в тексте статьи.** Таблицы и графики должны быть озаглавлены.

6. Фотографии должны быть контрастными, фотокопии с рентгенограмм - в позитивном изображении. Рисунки, чертежи и диаграммы следует озаглавить, пронумеровать и вставить в соответствующее место текста **в tiff формате**.

В подписях к микрофотографиям следует указывать степень увеличения через окуляр или объектив и метод окраски или импрегнации срезов.

7. Фамилии отечественных авторов приводятся в оригинальной транскрипции.

8. При оформлении и направлении статей в журнал МНГ просим авторов соблюдать правила, изложенные в «Единых требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», принятых Международным комитетом редакторов медицинских журналов - <http://www.spinesurgery.ru/files/publish.pdf> и http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html В конце каждой оригинальной статьи приводится библиографический список. В список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте. Список составляется в алфавитном порядке и нумеруется. Литературный источник приводится на языке оригинала. В списке литературы сначала приводятся работы, написанные знаками грузинского алфавита, затем кириллицей и латиницей. Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы. Большинство цитированных источников должны быть за последние 5-7 лет.

9. Для получения права на публикацию статья должна иметь от руководителя работы или учреждения визу и сопроводительное отношение, написанные или напечатанные на бланке и заверенные подписью и печатью.

10. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью приведены их фамилии, имена и отчества, указаны служебный и домашний номера телефонов и адреса или иные координаты. Количество авторов (соавторов) не должно превышать пяти человек.

11. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи. Корректура авторам не высылается, вся работа и сверка проводится по авторскому оригиналу.

12. Недопустимо направление в редакцию работ, представленных к печати в иных издательствах или опубликованных в других изданиях.

При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются.

REQUIREMENTS

Please note, materials submitted to the Editorial Office Staff are supposed to meet the following requirements:

1. Articles must be provided with a double copy, in English or Russian languages and typed or computer-printed on a single side of standard typing paper, with the left margin of 3 centimeters width, and **1.5** spacing between the lines, typeface - **Times New Roman (Cyrillic)**, print size - **12** (referring to Georgian and Russian materials). With computer-printed texts please enclose a CD carrying the same file titled with Latin symbols.

2. Size of the article, including index and resume in English, Russian and Georgian languages must be at least 10 pages and not exceed the limit of 20 pages of typed or computer-printed text.

3. Submitted material must include a coverage of a topical subject, research methods, results, and review.

Authors of the scientific-research works must indicate the number of experimental biological species drawn in, list the employed methods of anesthetization and soporific means used during acute tests.

4. Articles must have a short (half page) abstract in English, Russian and Georgian (including the following sections: aim of study, material and methods, results and conclusions) and a list of key words.

5. Tables must be presented in an original typed or computer-printed form, instead of a photocopied version. **Numbers, totals, percentile data on the tables must coincide with those in the texts of the articles.** Tables and graphs must be headed.

6. Photographs are required to be contrasted and must be submitted with doubles. Please number each photograph with a pencil on its back, indicate author's name, title of the article (short version), and mark out its top and bottom parts. Drawings must be accurate, drafts and diagrams drawn in Indian ink (or black ink). Photocopies of the X-ray photographs must be presented in a positive image in **tiff format**.

Accurately numbered subtitles for each illustration must be listed on a separate sheet of paper. In the subtitles for the microphotographs please indicate the ocular and objective lens magnification power, method of coloring or impregnation of the microscopic sections (preparations).

7. Please indicate last names, first and middle initials of the native authors, present names and initials of the foreign authors in the transcription of the original language, enclose in parenthesis corresponding number under which the author is listed in the reference materials.

8. Please follow guidance offered to authors by The International Committee of Medical Journal Editors guidance in its Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals publication available online at: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.icmje.org/urm_full.pdf

In GMN style for each work cited in the text, a bibliographic reference is given, and this is located at the end of the article under the title "References". All references cited in the text must be listed. The list of references should be arranged alphabetically and then numbered. References are numbered in the text [numbers in square brackets] and in the reference list and numbers are repeated throughout the text as needed. The bibliographic description is given in the language of publication (citations in Georgian script are followed by Cyrillic and Latin).

9. To obtain the rights of publication articles must be accompanied by a visa from the project instructor or the establishment, where the work has been performed, and a reference letter, both written or typed on a special signed form, certified by a stamp or a seal.

10. Articles must be signed by all of the authors at the end, and they must be provided with a list of full names, office and home phone numbers and addresses or other non-office locations where the authors could be reached. The number of the authors (co-authors) must not exceed the limit of 5 people.

11. Editorial Staff reserves the rights to cut down in size and correct the articles. Proof-sheets are not sent out to the authors. The entire editorial and collation work is performed according to the author's original text.

12. Sending in the works that have already been assigned to the press by other Editorial Staffs or have been printed by other publishers is not permissible.

**Articles that Fail to Meet the Aforementioned
Requirements are not Assigned to be Reviewed.**

ავტორია საშურალებოდ!

რედაქციაში სტატიის წარმოდგენისას საჭიროა დავიცვათ შემდეგი წესები:

1. სტატია უნდა წარმოადგინოთ 2 ცალად, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე, დაბეჭდილი სტანდარტული ფურცლის 1 გვერდზე, 3 სმ სიგანის მარცხენა ველისა და სტრიქონებს შორის 1,5 ინტერვალის დაცვით. გამოყენებული კომპიუტერული შრიფტი რუსულ და ინგლისურენოვან ტექსტებში - **Times New Roman (Кириллицა)**, ხოლო ქართულენოვან ტექსტში საჭიროა გამოვიყენოთ **AcadNusx**. შრიფტის ზომა – 12. სტატიას თან უნდა ახლდეს CD სტატიით.

2. სტატიის მოცულობა არ უნდა შეადგენდეს 10 გვერდზე ნაკლებს და 20 გვერდზე მეტს ლიტერატურის სის და რეზიუმების (ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე) ჩათვლით.

3. სტატიაში საჭიროა გამუქდეს: საკითხის აქტუალობა; კვლევის მიზანი; საკვლევი მასალა და გამოყენებული მეთოდები; მიღებული შედეგები და მათი განსჯა. ექსპერიმენტული ხასიათის სტატიების წარმოდგენისას ავტორებმა უნდა მიუთითონ საექსპერიმენტო ცხოველების სახეობა და რაოდენობა; გაუტკივარებისა და დაძინების მეთოდები (მწვავე ცდების პირობებში).

4. სტატიას თან უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე არანაკლებ ნახევარი გვერდის მოცულობისა (სათაურის, ავტორების, დაწესებულების მითითებით და უნდა შეიცავდეს შემდეგ განყოფილებებს: მიზანი, მასალა და მეთოდები, შედეგები და დასკვნები; ტექსტუალური ნაწილი არ უნდა იყოს 15 სტრიქონზე ნაკლები) და საკვანძო სიტყვების ჩამონათვალი (key words).

5. ცხრილები საჭიროა წარმოადგინოთ ნაბეჭდი სახით. ყველა ციფრული, შემაჯამებელი და პროცენტული მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს ტექსტში მოყვანილს.

6. ფოტოსურათები უნდა იყოს კონტრასტული; სურათები, ნახაზები, დიაგრამები - დასათაურებული, დანორმილი და სათანადო ადგილას ჩასმული. რენტგენოგრამების ფოტოსალები წარმოადგინეთ პოზიტიური გამოსახულებით **tiff** ფორმატში. მიკროფოტ-სურათების წარწერებში საჭიროა მიუთითოთ ოკულარის ან ობიექტივის საშუალებით გადიდების ხარისხი, ანათალების შედეგის ან იმპრეგნაციის მეთოდი და აღნიშნოთ სურათის ზედა და ქვედა ნაწილები.

7. სამამულო ავტორების გვარები სტატიაში აღინიშნება ინიციალების თანდართვით, უცხოურისა – უცხოური ტრანსკრიპციით.

8. სტატიას თან უნდა ახლდეს ავტორის მიერ გამოყენებული სამამულო და უცხოური შრომების ბიბლიოგრაფიული სია (ბოლო 5-8 წლის სიღრმით). ანბანური წყობით წარმოდგენილ ბიბლიოგრაფიულ სიაში მიუთითეთ ჯერ სამამულო, შემდეგ უცხოელი ავტორები (გვარი, ინიციალები, სტატიის სათაური, ურნალის დასახელება, გამოცემის ადგილი, წელი, ურნალის №, პირველი და ბოლო გვერდები). მონოგრაფიის შემთხვევაში მიუთითეთ გამოცემის წელი, ადგილი და გვერდების საერთო რაოდენობა. ტექსტში კვადრატულ ფრჩილებში უნდა მიუთითოთ ავტორის შესაბამისი N ლიტერატურის სიის მიხედვით. მიზანშეწონილია, რომ ციტირებული წყაროების უმეტესი ნაწილი იყოს 5-6 წლის სიღრმის.

9. სტატიას თან უნდა ახლდეს: ა) დაწესებულების ან სამეცნიერო ხელმძღვანელის წარდგინება, დამოწმებული ხელმოწერითა და ბეჭდით; ბ) დარგის სპეციალისტის დამოწმებული რეცეზია, რომელშიც მითითებული იქნება საკითხის აქტუალობა, მასალის საკმაობა, მეთოდის სანდოობა, შედეგების სამეცნიერო-პრაქტიკული მნიშვნელობა.

10. სტატიის ბოლოს საჭიროა ყველა ავტორის ხელმოწერა, რომელთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს.

11. რედაქცია იტოვებს უფლებას შეასწოროს სტატია. ტექსტშე მუშაობა და შეჯრება ხდება საავტორო ორიგინალის მიხედვით.

12. დაუშვებელია რედაქციაში ისეთი სტატიის წარდგენა, რომელიც დასაბეჭდიდად წარდგენილი იყო სხვა რედაქციაში ან გამოქვეყნებული იყო სხვა გამოცემებში.

აღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში სტატიები არ განიხილება.

Содержание:

Voitiv Y., Usenko O., Dosenko V., Dyadyk O., Dzhemiliev A. ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF MATRIX METALLOPROTEINASE-2 ($C^{1306} \rightarrow T$) AND TISSUE INHIBITORS OF METALLOPROTEINASE-2 ($G^{303} \rightarrow A$) GENES IN PATIENTS WITH ANASTOMOTIC LEAK IN HOLLOW DIGESTIVE ORGANS.....	7
Bekisheva A., Makishev A. EFFECTS OF NUTRITIONAL TREATMENT ON THE QUALITY OF LIFE IN THE PATIENTS AFTER RADICAL SURGERY FOR COLON CANCER	13
Giorgobiani G., Kvashilava A. CURRENT TREATMENT STANDARDS OF COMPLEX, LARGE SIZED INCISIONAL HERNIAS.....	19
Khatchapuridze Kh., Tananashvili D., Todua K., Kekelidze N., Tsitsishvili Z., Mchedlishvili M., Kordzaia D. OVARIAN CANCER TREATMENT OPTIMIZATION: THE COMPLEX ANALYSIS OF THE RESULTS OF CYTOREDUCTIVE SURGERY, MICROSCOPIC MALIGNANCY AND T-LYMPHOCYTIC INFILTRATION OF THE TUMOR.....	23
Васильев А.Ю., Павлова Т.В. ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ МАРКИРОВКИ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ.....	30
Kikodze N., Iobadze M., Pantsulaia I., Mizandari M., Janikashvili N., Chikovani T. EFFECTS OF DIFFERENT TREATMENT OPTIONS ON THE LEVEL OF SERUM CYTOKINES IN PATIENTS WITH LIVER CANCER	35
Григорьев И.В., Лазко Ф.Л., Призов А.П., Канаев А.С., Лазко М.Ф. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ КРЮЧКОВИДНОЙ ПЛАСТИНОЙ И ПУГОВЧАТОЙ ФИКСАЦИЕЙ TIGHTROPE	39
Меньшиков В.В., Лазко Ф.Л., Призов А.П., Беляк Е.А., Залян А.А. ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ХАГЛУНДА	44
Zasieda Y. COMBINED TREATMENT WITH FOCUSED LOW-INTENSITY SHOCK-WAVE THERAPY AND ANDROGEN-STIMULATION THERAPY IN MEN WITH CORPORAL VENO-OCLUSIVE ERECTILE DYSFUNCTION ON THE BACKGROUND OF HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM.....	49
Lesovoy V., Shchukin D., Khareba G., Antonyan I., Lisova G., Demchenko V., Olkhovska V. RESULTS OF EXTRACORPOREAL NEPHRON-SPARING SURGERY FOR RENAL CELL CARCINOMA WITH AUTOTRANSPLANTATION.....	53
Савчук Т.В., Куркевич А.К., Лещенко И.В. КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ СИНДРОМА ЛЕВОСТОРОННЕЙ ГИПОПЛАЗИИ СЕРДЦА У ОДНОГО ИЗ БЛИЗНЕЦОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ. СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.....	62
Ratsyborynska-Polyakova N., Hrizhymalska K., Andrushkova O., Lagorzhevska I. FEATURES OF AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR IN MENTAL DISORDERS: SELF- PERFORATION OF EYE IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA (CLINICAL CASE)	69
Гоготишивили М.Т., Абашидзе Н.О., Корсантия Б.М. ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО И ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЛАЗОЛЕКСА У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ	73
Lyubchenko A., Tkachenko Yu. EXPERIENCE OF CLINICAL APPLICATION OF SURFACE ELECTROMYOGRAPHY AND LIGHT-CURING HYDROSTATIC SPLINT EASY BITE® IN ORTHODONTIC TREATMENT	78
Русин В.И., Горленко Ф.В., Добош В.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА	85
Matsyura O., Besh L., Besh O., Troyanovska O., Slyuzar Z. HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO FOOD ADDITIVES IN PEDIATRIC PRACTICE: TWO CLINICAL CASES	91
Nykytyuk S., Klymnyuk S., Podobivsky S., Levenets S., Stelmakh O. LYME BORRELIOSIS - ENDEMIC DISEASE IN CHILDREN OF TERNOPILO REGION	95

Solovyova G., Alianova T., Taran A., Aleksieieva V., Gulieva L. RISK FACTORS AND COMORBIDITY IN DIFFERENT TYPES OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA: RETROSPECTIVE COHORT ANALYSIS	104
Rakhypbekov T., Shalgumbayeva G., Siyazbekova Z., Myssayev A., Brusati L. RESULTS AND ADVERSE OUTCOMES AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: HISTORICAL COHORT STUDY	108
Halushko O., Loskutov O., Kuchynska I., Syntytsyn M., Boliuk M. THE MAIN CAUSES OF THE COMPLICATED COURSE OF COVID-19 IN DIABETIC PATIENTS (REVIEW).....	114
Кудабаева Х.И., Космуратова Р.Н., Базаргалиев Е.Ш., Таутанова А.К., Даржанова К.Б. МАРКЕРЫ ОЖИРЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ (ОБЗОР)	121
Батарбекова Ш.К., Жунусова Д.К., Дербисалина Г.А., Бекбергенова Ж.Б., Рахымгалиева Г.Б. ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА К ЗАБОЛЕВАНИЮ	127
Babkina O., Danylchenko S., Varukha K., Volobuev O., Ushko I. DIAGNOSIS OF BLUNT TRAUMA OF KIDNEY INJURY WITH INFRARED THERMOMETER METHOD.....	132
Волошина Н.П., Василовский В.В., Черненко М.Е., Сухоруков В.В., Вовк В.И. АНАЛИЗ АРХИТЕКТОНИКИ НОЧНОГО СНА У БОЛЬНЫХ РАЗНЫМИ ТИПАМИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА	137
Khoroshukha M., Bosenko A., Tymchyk O., Nevedomsjka J., Omeri I. RESEARCH OF PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION FUNCTION IN 13-15 YEAR-OLD ATHLETES WITH DIFFERENT BLOOD GROUPS.....	142
Burjanadze G., Kuridze N., Goloshvili D., Merkviladze N., Papava M. BIOCHEMICAL ASPECTS OF SYMPTOMATIC TREATMENT IN PATIENTS WITH COVID-19 (REVIEW).....	149
Markosyan R., Volevodz N. ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME, REVIEW OF LITERATURE BASED ON CASE REPORTS	154
Jachvadze M., Gogberashvili K. ASSESSMENT OF KNOWLEDGE LEVEL AMONG GEORGIAN PARENTS ABOUT VITAMIN D INFLUENCE ON CHILD'S HEALTH. QUESTIONNAIRE SURVEY	158
Kibkalo D., Timoshenko O., Morozenko D., Makolinets V., Gliebova K. EXPERIMENTAL STUDY OF STRESS EFFECT ON CONNECTIVE TISSUE METABOLISM IN WHITE RATS DURING SUBCUTANEOUS ADRENALINE ADMINISTRATION	161
Прошин С.Н., Багатурия Г.О., Чернов И.А., Хаев О.А., Очир-Гараев А.Н. ХИРУРГИЧЕСКИ ВЫЗВАННАЯ ТРАВМА И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА БЕТУЛИНСОДЕРЖАЩИХ МАЗЕЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)	165
Osipiani B., Machavariani T. STRUCTURAL CHANGES AND MORPHOMETRIC ANALYSIS OF CARDIOMYOCYTES IN RATS WITH ALLOXAN DIABETES	169
Штанюк Е.А., Коваленко Т.И., Красникова Л.В., Мишина М.М., Вовк А.О. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕВОФЛОКСАЦИНА И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (ОБЗОР).....	173
Deshko L., Bysaga Y., Vasylchenko O., Nechyporuk A., Pifko O., Berch V. MEDICINES: TECHNOLOGY TRANSFER TO PRODUCTION, CESSION OF OWNERSHIP RIGHTS FOR REGISTRATION CERTIFICATES AND TRANSFER OF PRODUCTION IN CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES TO NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY	180
Tavolzhanska Yu., Grynochak S., Pcholkin V., Fedosova O. SEVERE PAIN AND SUFFERING AS EFFECTS OF TORTURE: DETECTION IN MEDICAL AND LEGAL PRACTICE	185
Muzashvili T., Kepuladze Sh., Gachechiladze M., Burkadze G. DISTRIBUTION OF SEX HORMONES AND LYMPHOCYTES IN REPRODUCTIVE WOMAN WITH THYROID PAPILLARY CARCINOMA AND HASHIMOTO'S THYROIDITIS	193

применен личностный опросник Бехтеревского института. Среди опрошенных пациентов у 8,5% мужчин и 9,4% женщин диагностирован ипохондрический тип. Сенситивный тип отмечен у 8,5% мужчин и 7,5% женщин. Основной признак эргопатического типа – уход от болезни в работу, в нашем случае - у 10,6% мужчин и 5,7% женщин. 13,2% женщин и 2,1% мужчин относятся к паранойальному типу. В 15% случаев отмечен меланхолический тип у мужчин, 5,7% женщин относятся к эйфорическому типу. Из всех опрошен-

ных 6,4% относятся к гармоническому типу. У 6,4% мужчин и 9,4% женщин определен тревожный тип.

Любое заболевание сопровождается более или менее серьезными изменениями психики пациента. В частности, в период болезни пациенты особо нуждаются в поддержке родных и близких. Поэтому в процессе лечения заболевания значимым аспектом является не только лекарственная терапия, но и эмоциональный настрой самого пациента.

რეზიუმე

შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ით ავადმყოფების დამოკიდებულება დაავადების მიმართ

შ.ბატარბეგოვა, დ.უნესოვა, გ.დერბისალინა, ქ.ბეგერგენოვა, გ.რახიმგალიევა

არასაჯარო სააქციო საზოგადოება "სამედიცინო უნივერსიტეტი ასტანი", ნურ-სულტანი, ყაზახეთი

კვლევის მიზანის წარმოადგენდა შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ით ავადმყოფების დაავადების მიმართ დამოკიდებულების განსაზღვრა.

კვლევაში მონაწილეობდა 100 ავადმყოფი შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ით, 21-დან 80 წლის ასაკში, 47 მამაკაცი და 53 ქალი. დაავადების მიმართ ავადმყოფების დამოკიდებულების განსაზღვრისათვის გამოყენებული იყო ბესტერევის ინსტიტუტის პიროვნების კომპარი. გამოკონტულთა შორის 8,5% მამაკაცს და 9,4% ქალს აღმოაჩნდა იპოქონდრიული ტიპი, 8,5% მამაკაცს და 7,5% ქალს - სენსიტიური ტიპი. ერგოპატიური ტიპი, რაც გულისხმობს ავადმყოფობისთვის თავის არიდებას მუშაობაში ჩართულობით, აღმოაჩნდა 10,6%

მამაკაცს და 5,7% ქალს. პარანოული ტიპი ახასიათებდა 13,2% ქალს და 2,1% მამაკაცს, მედონქოლიური ტიპი - 15% მამაკაცს; 5,7% ქალს აღმოაჩნდა ეიფორიული ტიპი. გამოკონტულთა 6,4% განეკუთვნა პარმონიულ ტიპს. 6,4% მამაკაცს და 9,4% ქალს განესაზღვრა შეფორმირდა ტიპი.

ნებისმიერი დაავადების იწვევს მეტნალკებად სერიოზულ ცვლილებებს პაციენტის ფსიქიკაში და დაავადების პერიოდში პაციენტებს სჭირდებათ ნათესავებისა და ახლობლების თანადგომა, ამიტომ, მეტრნალობის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს არა მხოლოდ მედიკამენტური თერაპია, არამედ ავადმყოფის ემოციური განწყობა.

DIAGNOSIS OF BLUNT TRAUMA OF KIDNEY INJURY WITH INFRARED THERMOMETER METHOD

¹Babkina O., ²Danylchenko S., ¹Varukha K., ¹Volobuev O., ¹Ushko I.

¹O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv; ²Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Traumatic injuries account for about 40% of violent deaths and about 26% of all deaths. In the structure of mortality from traumas, the number of traumatic and traumatic brain injuries prevails, the second place is occupied by the combined trauma, and the third place is shared by the injuries of the chest and abdominal organs [1-3]. Among those killed are men of working age - 20-60 years, which underscores the relevance and feasibility of research to develop preventative measures to reduce injuries. Research on kidney damage in medical practice is quite common and is of scientific and practical value for both clinicians and forensics. A number of authors found that kidney damage among the blunt trauma of the abdominal cavity occurs in 6 to 18% of cases [4-6]. According to some authors, when they fall from the height of the kidney, 28.8% of all cases with damage to the abdomen are injured. The rest of the kidney injury in people with closed abdominal trauma was observed in 6.1% of cases, with 60% of cases of kidney injury combined with damage to

other abdominal organs [7-9]. Our research has confirmed that the use of infrared histological and thermometry methods for the study of traumatic and intact abdominal cavity and abdominal space is of great importance in the diagnosis of trauma from dull objects [10-13].

The aim of the study. The study of the prescription of injury on the dynamics of changes in temperature indices of the injured kidney tissues in blunt trauma.

Material and methods. The material of the study to date are the tissues of the kidneys of 256 male and female persons, aged 20 to 60 years, who died at a known time of trauma and prescription of death in the were subject to autopsy at the Department forensic examination of the Luhansk region during 2008-2013. In our studies, we studied the temperature of the kidneys at 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 24 hours after the autopsy. The ambient temperature in the department autopsy the studies was 18°C. To address the question of the age of occurrence of kidney

damage, we used a modern method of infrared thermometry. The study was performed using a TH 9100 PMVI-WL Thermo Tracker thermal imager, which is a contactless high-sensitivity infrared camera. The work was carried out in accordance with the requirements of the «Instructions on the forensic medical examination» (Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 6 of 01/17/1995), in accordance with the requirements and norms, a typical provision on ethics of the Ministry of Health of Ukraine No. 690 of 09/23/2009, «The procedure for the removal of biological objects from the dead, whose bodies are subject to forensic examination and pathological examination, for scientific purposes» (2018).

Results and discussion. When carrying out the thermometry of the kidneys, it should be borne in mind that the location of the kidneys with a pronounced network of blood vessels cre-

ates the opportunity for the formation of large hemorrhages in them and disruption of tissue integrity in trauma, as well as that the right kidney is protected more than left; in women, the kidneys are lower than in men. According to our data, a well-anamnesis, knowledge of the mechanism of trauma, laboratory tests of blood and urine (determining the increase in the content of trypsin, amylase, lipase, etc.), conducting laparoscopy of the abdominal cavity and retroperitoneal space, ultrasound of the internal organs helps with the establishment of kidney injury.

The analysis of the obtained kidney thermograms showed that the temperature indices in the area of the injured kidney tissues and intact parts gradually decrease with time after injury and have a certain pattern of decrease. A gradual decrease in temperature is shown in Figures 1-4.




Fig. 1. The temperature of the tissues of the kidneys after 5 minutes after opening. E - is the area of damage of the left kidney; A, B, C, D, H - are the areas of intact tissues of the right and left kidneys




Fig. 2. Temperature of kidney tissues within 1 hour after opening. E - is the area of damage of the left kidney; A, B, C, D, H - are the areas of intact tissues of the right and left kidneys




Fig. 3. Temperature of kidney tissues 12 hours after opening. E - is the area of damage of the left kidney; A, B, C, D, H - are the areas of intact tissues of the right and left kidneys




Fig. 4. Temperature of kidney tissues 24 hours after opening. E - is the area of damage of the left kidney; A, B, C, D, H - are the areas of intact tissues of the right and left kidneys

After statistical processing of the obtained temperature indicators of the kidneys from the area of damage and located adjacent to its intact tissues, with obligatory consideration of the temperature indices of the outer skin, we found that there is a significantly statically significant decrease in the temperature indices of the right and left kidneys, as in men and women, depending on the ambient temperature at the time of death and the thickness of the subcutaneous tissue. The aforementioned statistically significant dynamics allowed us to develop mathematical models for the most accurate determination of limitation of the

onset of death according to changes in the temperature indices of the left and right kidneys taking into account external and internal factors, such as ambient temperature and biological features of the organism of the dead. In our study, it was found that such a factor as gender, the temperature of both kidneys is not significantly affected.


The dynamics of changes in the temperature indicators of the kidneys, depending on the sex and temperature of the environment in the dead after a blunt kidney injury are shown in Tables 1 and 2 and Graphs 1 and 2.

Table 1. Dynamics of changes in the average values of the temperature of the right kidney, depending on sex and ambient temperature, $M \pm m$ (95% CI)

Terms of study after autopsy	Negative temperature		Level of difference	Positive temperature		Level of difference
	Male, n=76	Female n=32		Male, n=80	Female n=68	
5 minutes	18,31±0,27 (17,77 – 18,84)	17,31±0,42 (16,44 – 18,17)	0,10	17,83±0,20 (17,44 – 18,21)	15,93±0,15 (15,63 – 16,22)	<0,0001
1 hour	17,87±0,28 (17,31 – 18,44)	16,94±0,43 (16,06 – 17,82)	0,21	17,43±0,20 (17,02 – 17,83)	15,41±0,15 (15,10 – 15,71)	<0,0001
2 hour	17,73±0,28 (17,17 – 18,29)	16,69±0,44 (15,79 – 17,59)	0,08	17,19±0,20 (16,79 – 17,58)	15,29±0,16 (14,98 – 15,60)	<0,0001
4 hour	17,49±0,28 (16,92 – 18,05)	16,43±0,45 (15,51 – 17,35)	0,09	16,94±0,20 (16,54 – 17,33)	15,08±0,16 (14,76 – 15,39)	<0,0001
6 hour	17,29±0,29 (16,72 – 17,86)	16,21±0,45 (15,28 – 17,13)	0,056	16,73±0,20 (16,33 – 17,13)	14,90±0,16 (14,58 – 15,21)	<0,0001
10 hour	17,02±0,29 (16,45 – 17,59)	15,95±0,45 (15,02 – 16,88)	0,046	16,45±0,20 (16,06 – 16,85)	14,71±0,16 (14,40 – 15,03)	<0,0001
14 hour	16,94±0,30 (16,34 – 17,53)	15,84±0,48 (14,86 – 16,81)	0,06	16,24±0,20 (15,84 – 16,63)	14,59±0,17 (14,25 – 14,92)	<0,0001
16 hour	16,69±0,30 (16,09 – 17,30)	15,63±0,46 (14,68 – 16,57)	0,17	16,11±0,20 (15,70 – 16,51)	14,47±0,16 (14,15 – 14,79)	<0,0001
18 hour	16,60±0,29 (16,02 – 17,17)	15,51±0,46 (14,57 – 16,45)	0,027	15,95±0,20 (15,55 – 16,35)	14,38±0,16 (14,06 – 14,70)	<0,0001
20 hour	16,47±0,29 (15,90 – 17,03)	15,42±0,45 (14,49 – 16,34)	0,049	15,85±0,20 (15,46 – 16,25)	14,30±0,16 (13,98 – 14,62)	<0,0001
24 hour	16,37±0,29 (15,80 – 16,93)	15,32±0,45 (14,39 – 16,24)	0,049	15,75±0,20 (15,36 – 16,15)	14,20±0,16 (13,88 – 14,52)	<0,0001

Table 2. Dynamics of changes in mean values of left kidney temperature depending on sex and ambient temperature, $M \pm m$ (95% CI)

Terms of study after autopsy	Negative temperature		Level of difference	Positive temperature		Level of difference
	Male, n=76	Female n=32		Male, n=80	Female n=32	
5 minutes	18,30±0,25 (17,80 – 18,80)	17,11±0,46 (16,17 – 18,06)	0,001	17,90±0,18 (17,53 – 18,26)	15,74±0,14 (15,47 – 16,01)	<0,0001
1 hour	17,89±0,26 (17,37 – 18,42)	16,75±0,47 (15,79 – 17,71)	0,002	17,35±0,19 (16,97 – 17,72)	15,37±0,14 (15,09 – 15,65)	<0,0001
2 hour	17,73±0,26 (17,20 – 18,25)	16,49±0,48 (15,52 – 17,47)	0,001	17,09±0,19 (16,71 – 17,46)	15,20±0,14 (14,91 – 15,48)	<0,0001
4 hour	17,49±0,27 (16,96 – 18,02)	16,22±0,49 (15,23 – 17,21)	0,002	16,80±0,19 (16,43 – 17,17)	14,96±0,14 (14,68 – 15,25)	<0,0001
6 hour	17,28±0,27 (16,75 – 17,81)	16,00±0,49 (15,00 – 17,00)	0,002	16,61±0,19 (16,23 – 16,98)	14,79±0,14 (14,51 – 15,08)	<0,0001
10 hour	17,01±0,27 (16,47 – 17,54)	15,75±0,49 (14,75 – 16,75)	0,004	16,34±0,18 (15,97 – 16,70)	14,62±0,14 (14,33 – 14,91)	<0,0001
14 hour	16,85±0,27 (16,32 – 17,38)	15,54±0,49 (14,55 – 16,54)	0,002	16,16±0,19 (15,79 – 16,54)	14,49±0,15 (14,19 – 14,78)	<0,0001
16 hour	16,70±0,28 (16,15 – 17,25)	15,44±0,50 (14,42 – 16,46)	0,002	15,97±0,19 (15,59 – 16,35)	14,36±0,15 (14,06 – 14,65)	<0,0001
18 hour	16,59±0,27 (16,05 – 17,13)	15,31±0,49 (14,30 – 16,32)	0,003	15,83±0,19 (15,46 – 16,20)	14,28±0,15 (13,98 – 14,58)	<0,0001
20 hour	16,47±0,27 (15,93 – 17,00)	15,23±0,49 (14,23 – 16,22)	0,003	15,73±0,19 (15,36 – 16,10)	14,20±0,15 (13,91 – 14,49)	<0,0001
24 hour	16,37±0,27 (15,83 – 16,90)	15,12±0,49 (14,13 – 16,12)	0,001	15,62±0,19 (15,25 – 15,99)	14,10±0,15 (13,81 – 14,39)	<0,0001




Graph 1. Dynamics of changes in temperature indicators of the right kidney, depending on the sex and temperature of the environment at the time of death.

$t^+ +$ pers - temperature indices of the tissues of the right kidney of men at a positive ambient temperature;

$t^- -$ persons are the temperature indices of the tissues of the right kidney of men at a negative ambient temperature;

$t^+ +$ women - temperature indices of women's right kidney tissues at positive ambient temperature;

$t^- -$ women - temperature indices of women's right kidney tissues at negative ambient temperature.



Graph 2. Dynamics of changes in temperature indices of the left kidney, depending on sex and ambient temperature at the time of death.

$t^+ +$ persons are the temperature indices of the tissues of the left kidney of men at a positive ambient temperature;

$t^- -$ persons - temperature indices of the tissues of the left kidney of men at a negative ambient temperature;

$t^+ +$ women - temperature indices of left kidney tissues of women at positive ambient temperature;

$t^- -$ women - temperature indices of women's left kidney tissues at negative ambient temperature.

However, in the area of trauma throughout the period after the autopsy of the dead (24 hours of study), observed higher quantitative temperature compared with non-injured kidney tissues, on average, 2-3 °C (± 0.28). To take into account the fact that

the right kidney is protected more than the left kidney and less vulnerable to body compression, it is not accompanied by a shift in the impact of traumatic objects; at 1.5-2 °C (± 0.14).

In this way, we came to the gown, who, when injured by blunt objects, are willing to take into account the laws of the organs of the black empty, that they must be injured a long time ago [6, 7]. In our opinion, the use of changes of only one injured organ to establish the limitation period of the caused mechanical damage from blunt trauma is not accurate enough, since pathological changes are observed not only in the area of the injury and one injured organ, but also in the intact internal organs and significantly affect for the course of pathological processes into organisms. Therefore, we believe that determining the limitation of the onset of mechanical trauma by changes in the infrared thermometry performed in the complex, it is appropriate and such that provide a full amount of information about the time of injury and we propose to apply only a comprehensive approach using both modern laboratory methods of investigation - infrared thermometry and traditional histological and histochemical methods.

Conclusions. Thus, as a result of the study, we discovered, first, that in traumatic and intact tissues of the kidneys in the victims of traumas there is a constant dynamics of decrease in temperature, which can be used as one of the criteria in establishing the limitation of the onset of injury; second, that higher quantitative temperature indicators are observed directly in the area of trauma compared to the non-injured kidney tissues and make a difference of an average of 2-3 °C (± 0.28).

However, it should be remembered that in the diagnosis of renal injury by infrared thermometry it is necessary to take into account the rate of cooling of the corpse, which is also affected by various factors: ambient temperature, humidity, the presence of clothing, the duration of the agonal period, etc. That is, all of the above should be taken into account when assessing the prescription of the onset of death and the prescription of damage on the temperature indicators of the internal organs, in particular the kidneys.

Research relation to the plans, programs and department themes. The study was carried out within the framework of the department research: "Pathogenetic substantiation of correction of pathophysiological disturbances in the human body under the influence of endogenous and exogenous factors", state registration number is 0118U004006

REFERENCES

1. Bjurlin M.A. Comparison of nonoperative and surgical management of renal trauma: can we predict when nonoperative management fails? / M.A. Bjurlin, R.J. Fantus, D. Villines // J Trauma Acute Care Surg 2017; 82: 356–361.
2. Goin G. Feasibility of selective non-operative management for penetrating abdominal trauma in France / G. Goin, D. Massalou, T. Bege, C. Contargyris, J.P. Avaro, G. Pauleau, P. Balandraud // J Visc Surg 2016; 154: 167–174.
3. Coccolini F. WSES classification and guidelines for liver trauma / F. Coccolini, F. Catena, E.E. Moore, R. Ivatury, W. Biffl, A. Peitzman, et al. // World J Emerg Surg 2016; 11: 50.
4. Mingoli A. Operative and nonoperative management for renal trauma: comparison of outcomes. A systematic review and meta-analysis / A. Mingoli, M. La Torre, E. Cirillo, M. Zambon, P. Sapienza, et al. // Ther Clin Risk Manag 2017; 13: 1127–1138.
5. Keihani S. Contemporary management of high-grade renal trauma: results from the American Association for the Surgery of Trauma Genitourinary Trauma study / S. Keihani et al. // J Trauma Acute Care Surg 2018; 84: 418–425.

6. Babkina O.P. Дослідження травми органів черевної порожнини лабораторними методами. LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd. Member of OmniScriptum Publishing Group. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2018. 148 p.
7. Kitrey N.D. EAU guidelines on urological trauma / N.D. Kitrey, N. Djakovic, F.E. Kuehhas, N. Lumen, E. Serafetinidis, D.M. European Association of Urology; 2018. p. 8–17.
8. Oyo-Ita A. Surgical versus non-surgical management of abdominal injury / A. Oyo-Ita, P. Chinnock, I.A. Ikpeme // Cochrane Database Syst Rev 2015: CD007383.
9. Fischer W. JOURNAL CLUB: incidence of urinary leak and diagnostic yield of excretory phase CT in the setting of renal trauma / W. Fischer, A. Wanaseela, S.D. Steenburg // AJR Am J Roentgenol 2015; 204: 1168–1172; quiz 1173.
10. Gorbach Alexander M. Assessment of Critical Renal Ischemia With Real-Time Infrared Imaging / Alexander M. Gorbach, Hengliang Wang, Nadeem N. Dhanani, Fred A. Gage, Peter A. Pinto, Paul D. Smith, et al. // J Surg Res 2008 Oct; 149(2): 310-8. doi: 10.1016/j.jss.2008.02.007
11. Tattersall G.J. Infrared thermography: A non-invasive window into thermal physiology / G.J. Tattersall // Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 2016 Dec; 202: 78-98. doi: 10.1016/j.cbpa.2016.02.022
12. Childs C. Body temperature and clinical thermometry / C. Childs // Handb Clin Neurol 2018; 157: 467-482. doi: 10.1016/B978-0-444-64074-1.00029-X
13. Babkina O.P. Usage of histological methods in determining the prescription of kidney injuries in forensic medical practice / O.P. Babkina, V.V. Zosimenko, S.I. Danylchenko, A.A. Chernozub, I.I. Vako, D.V. Morozenko // Wiadomości Lekarskie. 2019; LXXII(5/2): 988-992.

SUMMARY

DIAGNOSIS OF BLUNT TRAUMA OF KIDNEY INJURY WITH INFRARED THERMOMETER METHOD

¹Babkina O., ²Danylchenko S., ¹Varukha K., ¹Volobuev O., ¹Ushko I.

¹O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv; ²Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Aim - the study of the prescription of injury on the dynamics of changes in temperature indices of the injured kidney tissues in blunt trauma.

The material of the study to date are the tissues of the kidneys of 256 male and female persons, aged 20 to 60 years, who died at a known time of trauma and prescription of death in the were subject to autopsy. To address the question of the age of occurrence of kidney damage, we used a modern method of infrared thermometry (using a TH 9100 PMVI-WL Thermo Tracker thermal imager, which is a contactless high-sensitivity infrared camera).

In this way, we came to the point, who, when injured by blunt objects, are willing to take into account the laws of the organs of the black empty. However, in the area of trauma throughout the period after the autopsy of the dead (24 hours of study), observed higher quantitative temperature compared with non-injured kidney tissues, on average, 2-3 °C (± 0.28). To take into account the fact that the right kidney is protected more than the left kidney and less vulnerable to body compression, it is not accompanied by a shift in the impact of traumatic objects; at 1.5-2 °C (± 0.14).

We believe that determining the limitation period of the onset of mechanical trauma by changes in the infrared thermometry indices carried out in the complex are appropriate and such that provide the full amount of information about the time of causing the trauma.

Keywords: blunt injury, kidneys, diagnostics, infrared thermometry, injury limitation, pathological changes.

РЕЗЮМЕ

ДІАГНОСТИКА ТУПОЇ ТРАВМЫ ПОЧКИ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ

¹Бабкіна Е.П., ²Данильченко С.И., ¹Варуха Е.В.,
¹Волобуев А.Е., ¹Ушко Я.А.

¹Національний медичний університет ім. А.А. Богомольца, Київ; ²Чорноморський національний університет ім. Петра Могилы, Миколаїв, Україна

Цель исследования - изучение влияния травмы на динамику изменения температурных показателей поврежденных тканей почек при тупой травме.

Материалом исследования служили ткани почек, забранные во время вскрытия у 256 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 60 лет, умерших от травмы, с известным временем давности наступления травмы и смерти. Для решения вопроса о времени повреждения почек применен современный метод инфракрасной термометрии с использованием тепловизора TH 9100 PMVI-WL Thermo Tracker, (NEC Avio infrared Technologies Co. Ltd., Япония), который является бесконтактной высокочувствительной инфракрасной камеры.

В результате проведенного исследования установлена характерная динамика изменения температурных показателей при травме почек тупым предметом. Однако, в зоне травмы в течение всего периода после вскрытия (24 часа исследования) наблюдалась более высокие количественные температурные показатели непосредственно в области травмы почки, в среднем, на 2-3°C (± 0.28) в сравнении с неповрежденными тканями почки. Температурные показатели правой почки снижаются медленнее, в среднем, на 1,5-2°C (± 0.14) относительно левой, что связано с топографоанатомическими особенностями расположения почек.

Установлено, что при тупой травме в поврежденных и интактных тканях почек наблюдается закономерная динамика уменьшения температурных показателей, что может быть использовано для определения времени наступления травмы с помощью метода инфракрасной термометрии.

რეზიუმე

თირკმლის ბლაგვი ტრაგმის დიაგნოსტიკა ინფრაწილი თემით მერმომეტრის მეთოდით

¹ებაბკინა, ²ს.დანილენკო, ¹ე.ვარუხა, ¹ა.ვოლობუევი, ¹ი.უშკო

¹ა.ბოგომოლენკის სახ. ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტი, კიევ; ²პეტრი მოჟავრის სახ. შავი ხელის ეროვნული უნივერსიტეტი, მიკოლაივ, უკრაინა

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ბლაგვი ტრაგმის გავლენის შეფასება თირკმლის დაზიანებული ქსოვილის ტემპერატური მაჩვენებლების დინამიკაზე.

კვლევის მასალას წარმოადგენდა თირქმლების ქსოვილი, მიღებული 20-60 წლის ასაკის 256 მამაკაცის და ქალის გაპერიოდის შემდგომ, რომელთა სიგვდილი განვითარდა ტრავმის შედეგად; ტრავმის სანდაზმულობისა და სიგვდილის დადგომის ვადა ცნობილია. თირქმლის დაზიანების დროის დადგენის საკითხის გადაწყვეტილობის ვადა ცნობილია. თირქმლის დაზიანების დროის დადგენის საკითხის გადაწყვეტილობის ვადა ცნობილია.

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგენილია ტემპერატურული მაღალმგრძნობიარე ინფრაწილულ კამერას. ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგენილია ტემპერატურული მაღალმგრძნობიარე ინფრაწილულ კამერას.

მთელი პერიოდის განმავლობაში (კვლევის 24 საათი) უშუალოდ თირქმლის ტრავმის მიღამოში აღინიშნებოდა, საშუალოდ, 2-3°C-ით ($\pm 0,28$) უფრო მაღალი ტემპერატურული მაჩვენებლები, თირქმლის დაზიანებელ ქსოვილებთან შედარებით. მარჯვენა თირქმლის ტემპერატურული მაჩვენებლები, საშუალოდ, 1,5-2°C-ით ($\pm 0,14$) უფრო ნება მცირდება მარცხენასთან შედარებით, რაც დაკავშირებულია თირქმლების განლაგების ტოპოგრაფიულ-ანატომიურ თავისებურებებთან.

დადგენილია, რომ ბლაგვი ტრავმის დროს თირქმლების დაზიანებულ და ინტაქტურ ქსოვილებში აღინიშნება ტემპერატურული მაჩვენებლების შემცირების კანონზომიერი დინამიკა, რაც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ტრავმის განვითარების დროს განსაზღვრისათვის ინფრაწილული თერმომეტრის მეთოდით.

АНАЛИЗ АРХИТЕКТОНИКИ НОЧНОГО СНА У БОЛЬНЫХ РАЗНЫМИ ТИПАМИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Волошина Н.П., Василовский В.В., Черненко М.Е., Сухоруков В.В., Вовк В.И.

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины»;
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

Рассеянный склероз (РС) - хроническое, демиелинизирующее заболевание головного и спинного мозга, отличающееся разнообразием неврологических симптомов, развивающееся преимущественно у лиц молодого возраста [1].

На сегодняшний день различают следующие типы течения рассеянного склероза: ремитирующее-рецидивирующий (РРРС), первично-прогрессирующий (ППРС), вторично-прогрессирующий (ВПРС), прогрессирующее-рецидивирующий (ПРРС). Однако, несмотря на то, что основные клинические типы течения определены, биологически существует только 2 формы - рецидивирующая и прогрессирующая.

РРРС - наиболее распространенная форма, затрагивающая около 85% пациентов с РС. Для РРРС характерна манифестация в молодом возрасте, чередование клинических обострений и ремиссий с наличием очаговых неврологических симптомов поражения основных функциональных систем центральной нервной системы (ЦНС).

ППРС начинается с прогрессирования без рецидивов и составляет 10% и выше случаев РС, с характерной манифестацией в более позднем возрасте, резистентностью к проводимой терапии. Вовлечение в процесс спинного мозга чаще встречается при первично-прогрессирующем типе течения РС, иногда при отсутствии очаговых изменений на МРТ головного мозга.

ВПРС развивается у некоторых пациентов с рецидивирующими типами течения. Течение болезни продолжает ухудшаться с периодами стабилизации состояния или сглаживания выраженности симптомов.

ПРРС - редкая форма, поражающая менее 5% пациентов, прогрессирует с самого начала, с периодически возникающими нарастающими симптомами без периодов ремиссии.

В ряде случаев для характеристики клинического течения используются термины «прогрессирующее-ремитирующее»

и «ремитирующее-прогрессирующее» (РПРС) в зависимости от преобладания прогрессирования или наличия обострений и ремиссий [1-3].

В основе патогенеза РС лежит развитие процессов демиелинизации, аутоиммунного воспаления. Сочетанное развитие воспалительных и нейродегенеративных процессов в головном и спинном мозге проявляются в виде потенциально обратимых очаговых неврологических симптомов или прогрессирующей необратимой физической и когнитивной инвалидности и, в конечном итоге, приводят к атрофии структур ЦНС [1,4,5].

Совокупность вышеуказанных реакций вызывает нарушение проведения нервных импульсов по проводящим путям ЦНС и обуславливает развитие разнообразных неврологических проявлений РС, таких как пирамидные, мозжечковые, чувствительные нарушения, симптомы поражения ствола головного мозга, развитие ретробульбарного неврита, а также когнитивных и эмоционально-аффективных нарушений, сексуальной дисфункции [6].

Учитывая разнообразие клинических проявлений, вероятность изменения типа течения на прогрессирующий, распознавание, диагностика РС на ранних этапах является одной из трудных задач современной неврологии. При этом необходимо учитывать взаимосвязь различных факторов, в том числе и расстройств цикла сон-бодрствование.

Нарушения сна являются сложной, мультифакторной проблемой современной неврологии, встречающейся приблизительно в 60% случаев РС, в то время как патофизиологические аспекты этих симптомов мало изучены. Расстройства сна у пациентов с РС включают хроническую бессонницу, синдром обструктивного сонного апноэ, расстройство поведения во сне с быстрыми движениями глаз, нарколепсию, синдром беспокойных ног у взрослых и детей [7,8].